

# APIXABAN (ELIQUIS®) (阿哌沙班)

## 患者、家屬和護理者須知

這份病人須知單頁應該與APIXABAN (Eliquis®) 消費者用藥須知一起閱讀。可見以下網頁：

<http://bit.ly/1XgCFIm>

APIXABAN有助於防止形成血凝塊。

如果您正在服用任何其他藥物，需要告訴醫生或藥劑師。這包括任何維生素或礦物質、草藥補充劑或從藥房、超市或保健食品商店購買的非處方藥物。

最好隨身攜帶您服用的所有藥品最新清單。考慮佩戴醫療警示手鏈。

### 疾病、醫療和牙科手術

如果您發生意外或病情很嚴重，請告訴救護車和醫院的工作人員您在服用APIXABAN。在任何醫療手術（包括醫院手術、全科醫生診所或牙科診所的小手術）之前，請告訴醫生或牙醫您在服用APIXABAN。

不要停止服用APIXABAN，除非醫生告訴您這麼做。

### 如何服用APIXABAN？

請整片吞下。跟不跟食物一起攝入都可以。藥劑師可將APIXABAN放在韋伯斯特藥盒（Webster Pak®）之類的劑量管理輔助裝置裡。

### 如何存儲APIXABAN？

藥片應存放在陰涼乾燥處，溫度保持在30°C以下。把所有藥物放在兒童夠不到的地方。



APIXABAN (Eliquis®) 2.5毫克片劑  
(正面和背面)



APIXABAN (Eliquis®) 5毫克片劑  
(正面和背面)

不是實際的藥片尺寸

圖片獲澳大利亞MIMS許可

### 如果忘記服藥怎麼辦？

一旦記起來就馬上服下一次劑量。然後繼續照常服用APIXABAN。

如果服用下一次劑量的時間快到了，不要服用增加劑量來彌補忘服的片劑。

如果您錯過服用一次以上劑量，或者不能肯定該怎麼做，請立即請教醫生或藥劑師。



## APIXABAN的副作用

出血是APIXABAN主要的副作用。為了降低出血的可能性，請嚴格遵照醫囑服藥。

如果出現以下症狀，請立即與醫生聯絡，或就近去醫院急診室：

- 流鼻血
- 小便紅色或深色
- 開始咯血
- 嘔吐，嘔吐物深色或帶血
- 大便呈紅色或黑色（似焦油）
- 出血過多，或出血持續時間比平時長
- 出現原因不明的瘀傷，或瘀傷無理由變大
- 頭痛或頭暈

**如果出血嚴重，請直接就近去醫院急救部，告知他們您在服APIXABAN。**

APIXABAN的其它副作用包括：

- 胃灼熱，吞嚥時胃部不適
- 噁心、嘔吐、腹瀉、胃痛
- 頭暈，呼吸困難
- 發燒
- 皮膚和/或眼睛泛黃（黃疸）。

如果您出現上述任何症狀或在[消費者用藥須知](#)中列出的任何其他症狀而感到擔憂，請告訴醫生。

## 我需要進行什麼檢驗？

每年至少必須驗一次血，以確保您的劑量是正確的，沒有任何不希望出現的副作用。

## 如果跌倒或受傷該怎麼辦？

在服用APIXABAN期間，流血可能會比平常多。如果摔倒或傷到頭部或身體，即使沒有受傷的跡象，也應該告訴醫生。

## 懷孕或哺乳期間

在懷孕或哺乳期不能服用APIXABAN。如果您打算懷孕或認為您懷孕了，請儘快告訴您的醫生。

## APIXABAN服用說明

<Place Patient Sticker Here>

請您的醫生或藥劑師填寫下列關於如何服用APIXABAN的重要資訊。

劑量：

服用時間：

服用多久：

下次預約：

This information sheet has been adapted from MIMS Australia Eliquis® Apixaban Consumer Medicine Information (October, 2016)

APIXABAN (Eliquis®) Information for patients families & carers.  
Released April 2017  
© Clinical Excellence Commission 2017 SHPN (CEC) 170049