Simplified Chinese

APIXABAN (ELIQUIS®) (阿哌沙班)

患者、家属和护理者须知

这份病人须知单页应该与APIXABAN (Eliquis®) 消费者用药须知一起阅读。可见以下网页：
http://bit.ly/1XgCFIm

APIXABAN有助于防止形成血凝块。

如果您正在服用任何其他药物，需要告诉医生或药剂师。这包括任何维生素或矿物质、草药补充剂或从药房、超市或保健食品商店购买的非处方药物。

最好随身携带您服用的所有药品最新清单。考虑佩戴医疗警示手链。

疾病、医疗和牙科程序

如果您发生意外或病情很严重，请告诉救护车和医院的工作人员您在服用APIXABAN。在任何医疗程序（包括医院手术、全科医生诊所或牙科诊所的小手术）之前，请告诉医生或牙医您在服用APIXABAN。

不要停止服用APIXABAN，除非医生告诉您这么做。

如何服用APIXABAN?

请整片吞下。跟不跟食物一起摄入都可以。药剂师可将APIXABAN放在韦伯斯特药盒（Webster Pak®）之类的剂量管理辅助装置里。

如何存储APIXABAN?

药片应存放在阴凉干燥处，温度保持在30°C以下。把所有药物放在儿童够不到的地方。

APIXABAN (Eliquis®) **2.5毫克**片剂
(正面和背面)

APIXABAN (Eliquis®) **5毫克**片剂
(正面和背面)

不是实际的药片尺寸

图片获澳大利亚MIMS许可

如果忘记服药怎么办?

一旦记起来就马上服下一次剂量。然后继续照常服用APIXABAN。

如果服用下一次剂量的时间快到了，不要服用增加剂量来弥补忘服的片剂。

如果您错过服用一次以上剂量，或者不能肯定该怎么做，请立即请教医生或药剂师。

APIXABAN的副作用

出血是APIXABAN主要的副作用。为了降低出血的可能性，请严格遵照医嘱服药。

如果出现以下症状，请立即与医生联系，或就近去医院急诊室：

- 流鼻血
- 小便红色或深色
- 开始咯血
- 呕吐，呕吐物深色或带血
- 大便呈红色或黑色（似焦油）
- 出血过多，或出血持续时间比平时长
- 出现原因不明的瘀伤，或瘀伤无理由变大
- 头痛或头晕

如果出血严重，请直接就近去医院急救部，告知他们您在服APIXABAN。

APIXABAN的其它副作用包括：

- 胃灼热，吞咽时胃部不适
- 恶心、呕吐、腹泻、胃痛
- 头晕，呼吸困难
- 发烧
- 皮肤和/或眼睛泛黄（黄疸）。

如果您出现上述任何症状或在消费者用药须知中列出的任何其他症状而感到担忧，请告诉医生。

我需要进行什么检验?

每年至少必须验一次血，以确保您的剂量是正确的，没有任何不希望出现的副作用。

如果跌倒或受伤该怎么办?

在服用APIXABAN期间，流血可能会比平常多。如果摔倒或伤到头部或身体，即使没有受伤的迹象，也应该告诉医生。

怀孕或哺乳期间

在怀孕或哺乳期不能服用APIXABAN。如果您打算怀孕或认为您怀孕了，请尽快告诉您的医生。

APIXABAN服用说明

<Place Patient Sticker Here>

请您的医生或药剂师填写下列关于如何服用APIXABAN的重要信息。

剂量：

服用时间：

服用多久：

下次预约：

This information sheet has been adapted from MIMS Australia Eliquis® Apixaban Consumer Medicine Information (October, 2016)

APIXABAN (Eliquis®) Information for patients families & carers.
Released April 2017
© Clinical Excellence Commission 2017 SHPN (CEC) 170050