Traditional Chinese

RIVAROXABAN (XARELTO®) (利伐沙班)

患者、家屬和護理者須知

這份病人須知單頁應該與RIVAROXABAN (Xarelto®)消費者用藥須知一起閱讀。可見以下網頁：
http://bit.ly/2aydLjF

RIVAROXABAN有助於防止形成血凝塊。

如果您正在服用任何其他藥物，需要告訴醫生或藥劑師。這包括任何維生素或礦物質、草藥補充劑或從藥房、超市或保健食品商店購買的非處方藥物。

最好隨身攜帶您服用的所有藥品最新清單。考慮佩戴醫療警示手鏈。

疾病、醫療和牙科手術

如果您發生意外或病情很嚴重，請告訴救護車和醫院的工作人員您在服用RIVAROXABAN。在任何醫療手術（包括醫院手術、全科醫生診所或牙科診所的小手術）之前，請告訴醫生或牙醫您在服用RIVAROXABAN。

不要停止服用RIVAROXABAN，除非醫生告訴您這麼做。

服用RIVAROXABAN

請整片吞下。15毫克和20毫克的片劑應與食物一起攝入。10毫克片劑跟不跟食物一起攝入都可以。在服用之前，不要將藥片從包裝中取出來，也可以讓藥劑師將RIVAROXABAN放在韋伯斯特藥盒（Webster Pak®）之類的劑量管理輔助裝置裡。

如何儲存RIVAROXABAN？

應存放在30°C以下的陰涼乾燥處。把所有藥物存放在兒童夠不到的地方。

RIVAROXABAN (Xarelto®) **10毫克**片劑 *(正面和背面)*

RIVAROXABAN (Xarelto®) **15毫克**片劑 *(正面和背面)*

RIVAROXABAN (Xarelto®) **20毫克**片劑 *(正面和背面)*

不是實際的藥片尺寸

圖片獲澳大利亞MIMS許可

如果忘記服用片劑怎麼辦？

如果您是每天服一次，每次服一片：

- 在同一天您記起來時儘快服用
- 不要服用額外的片劑來彌補忘服的片劑
- 第二天服用下一次劑量，繼續照常每天服一片。

如果15毫克的片劑您每天服兩次：

- 在同一天您記起來時儘快服用
- 您可以同時服用2片15毫克的片劑，以達到一天30毫克的總劑量。
- 從第二天開始，您應該照常每天服兩次。

如果您錯過服用一次以上劑量，或者不能肯定該怎麼做，請立即請教醫生或藥劑師。

RIVAROXABAN的副作用

出血是RIVAROXABAN主要的副作用。為了降低出血的可能性，請嚴格遵照醫囑服藥。

如果出現以下症狀，請立即與醫生聯絡，或就近去醫院急診室：

- 流鼻血
- 小便紅色或深色
- 開始咯血
- 嘔吐，嘔吐物深色或帶血
- 大便呈紅色或黑色（似焦油）
- 出血過多，或出血持續時間比平時長
- 出現原因不明的瘀傷，或瘀傷無理由變大
- 頭痛或頭暈

如果出血嚴重，請直接就近去醫院急救部，告知他們您在服RIVAROXABAN。

RIVAROXABAN的其它副作用包括：

- 胃灼熱、消化不良
- 噁心、嘔吐、腹瀉、胃痛
- 頭暈，呼吸困難
- 發燒
- 皮膚和/或眼睛泛黃（黃疸）。

如果您出現上述任何症狀或在消費者用藥須知中列出的任何其他症狀而感到擔憂，請告訴醫生。

我需要進行什麼檢驗？

每年至少必須驗一次血，以確保您的劑量是正確的，沒有任何不希望出現的副作用。

如果跌倒或受傷該怎麼辦？

在服用RIVAROXABAN期間，流血可能會比平常多。如果摔倒或傷到頭部或身體，即使沒有受傷的跡象，也應該告訴醫生。

孕期或正在母乳餵養怎麼辦？

不建議在孕期或母乳餵養期間服用RIVAROXABAN。如果您打算懷孕或認為已經懷孕了，請儘快告訴醫生。

RIVAROXABAN服用説明

<Place Patient Sticker Here>

請您的醫生或藥劑師填寫下列關於如何服用RIVAROXABAN的重要資訊。

劑量：

服用時間：

服用多久：

下次預約：

This information sheet has been adapted from MIMS Australia Xarelto® Rivaroxaban Consumer Medicine Information (November, 2015)

RIVAROXABAN (Xarelto®) Information for patients, families & carers.
Released April 2017.
© Clinical Excellence Commission 2017. SHPN (CEC) 170043